



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области  
**«АРХАНГЕЛЬСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ  
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»**

ПРИКАЗ

от 19 января 2017 г. № 6-а

г. Архангельск

**Об утверждении показаний к госпитализации на плановое  
консервативное лечение**

В целях повышения качества и доступности специализированной офтальмологической помощи, оптимизации использования ресурсов системы ОМС, ликвидации очереди на плановую госпитализацию **приказываю:**

1. Утвердить:
  - 1.1 «Показания к госпитализации на плановое консервативное лечение в круглосуточный стационар для взрослых».
  - 1.2 «Показания к госпитализации на плановое консервативное лечение в круглосуточный стационар для детей»
  - 1.3 «Показания к госпитализации на плановое консервативное лечение в дневной стационар для взрослых»
  - 1.4 «Показания к госпитализации на плановое консервативное лечение в дневной детский стационар».
2. Курение пациента считать противопоказанием к госпитализации на плановые курсы нейропротективного лечения.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по медицинской части И.В. Тарабукину.

Главный врач

исп. И.В. Тарабукина  
Направлено: всем

В.А. Кабанов

УТВЕРЖДЕНО  
приказом главного врача  
от 19.01.2012 № 6-а

**Показания к госпитализации на плановое консервативное лечение  
в круглосуточный стационар для взрослых**

№	Диагноз, состояние
1	Глаукома в стадии суб- и декомпенсации ВГД при невозможности подбора гипотензивного режима в амбулаторных условиях или дневном стационаре
2	Глаукома нестабилизированная при противопоказанном оперативном лечении при необходимости круглосуточного медицинского наблюдения
3	Прогредиентное ухудшение зрительных функций при хронических заболеваниях при неэффективности амбулаторного лечения

УТВЕРЖДЕНО  
приказом главного врача  
от 19.01.2012 № 6-а

Показания к госпитализации на плановое **консервативное** лечение  
в дневной стационар для взрослых

№	Диагноз, состояние
1	Глаукома в стадии суб- и декомпенсации ВГД при невозможности подбора гипотензивного режима в амбулаторных условиях
2	Глаукома нестабилизированная при противопоказанном оперативном лечении при необходимости ежедневного медицинского наблюдения
3	Прогредиентное ухудшение зрительных функций при хронических заболеваниях при неэффективности амбулаторного лечения

УТВЕРЖДЕНО  
приказом главного врача  
от 19.01.2017 № 6-а

Показания к госпитализации на плановое **консервативное** лечение  
**в круглосуточный стационар для детей**

№	Диагноз, состояние
1	Прогрессирование аномалии рефракции более 1,0д в полгода в возрасте до 10 лет при невозможности аппаратного лечения в амбулаторных условиях
2	Необходимость аппаратного лечения в возрасте до 8 лет при невозможности его в амбулаторных условиях
3	Необходимость круглосуточного медицинского наблюдения и ухода за ребенком при медикаментозном и аппаратном лечении в возрасте до 18 лет
4	Необходимость проведения инвазивных медицинских манипуляций

УТВЕРЖДЕНО  
приказом главного врача  
от 19.01.2012 № 6-а

Показания к госпитализации на **плановое консервативное лечение**  
**в дневной детский стационар**

№	Диагноз, состояние	Возраст
1	Врожденная, вторичная глаукома компенсированная, 2-3 стадия	3-17 лет
2	Врожденная, вторичная глаукома субкомпенсированная для проведения суточной тонометрии	7-17 лет
3	Частичная атрофия зрительного нерва	4-17 лет
4	Ретинопатия недоношенных, рубцовая фаза	3-17 лет
5	Дистрофические заболевания сетчатки и хориоидей	3-17 лет
6	Частичная атрофия зрительного нерва	3-17 лет
7	Спазм аккомодации	6-16 лет
8	Врожденная миопия	3-16 лет
9	Прогрессирующая миопия слабой степени от <b>2 диоптрий</b> сопровождающаяся ПИНА <b>1 раз в год</b>	5-12 лет
10	Прогрессирующая миопия средней степени, сопровождающаяся ПИНА <b>1 раз в год</b>	7-14 лет
11	Дегенеративная миопия высокой степени (для противолистрофического курса)	7-16 лет
12	Привычно-избыточное напряжение аккомодации с <b>ЗОА до -1.0 д 1 раз в год</b>	6-12 лет
13	Косоглазие (курс ортоптики)	4-12 лет
14	Амблиопия: рефракционная, дисбинокулярная, обскурационная 2-3 степени (0,4 с коррекцией и ниже) <u>Противопоказание</u> для дальнейшего лечения: отсутствие эффекта после 2-3 курсов лечения	3-10 лет
15	Амблиопия: рефракционная, дисбинокулярная, обскурационная 1 степени (0,4 -0,7 с коррекцией) <u>Противопоказание</u> для дальнейшего лечения: отсутствие эффекта после 2-3 курсов лечения	3-8 лет